

治療中、快適に過ごすためのヒント

これらの方法は、発疹や爪周りの感染皮膚などの皮膚に関連する副作用、またはその他の副作用が生じる可能性の低下につながります。どのような方法があなたに合うか、担当医師と相談しましょう。

ケアチームと話し合うべき、毎日の在宅ケアの選択肢について



消毒剤（クロルヘキシジン 4% など）
1日1回、手指と足指の爪を洗うために使用しましょう



セラミド配合のやさしい保湿剤（La-Roche Posay Lipikar や CeraVe* など）
1日1回以上、顔や体に塗りましょう

* ご自身に合った方法について、担当医師と相談しましょう。



直射日光に当たるのを避けましょう
日焼け止め機能のある洋服を着用し、SPF30 以上の日焼け止めを付けましょう

治療中に役立つその他のヒント



- ぬるま湯または冷水（熱湯は避けてください）で入浴したり、シャワーを浴びたりしてください
- 敏感肌の方は、刺激の少ない石鹸やシャンプーを使用してください



- 敏感肌用の無香料の洗濯用洗剤を使用してください
- 柔らかく、ゆったりとした服を着用してください
- 爪の感染を引き起こす可能性のある活動（清掃など）を行う際は、手袋を着用してください

その他のお薬




- 皮膚に関連する副作用のリスクを低減するために、**経口や外用抗生物質が処方されることがあります**
- RYBREVANT® を LAZCLUZE™ と併用する場合、**血栓のリスクを低減するお薬が処方されます**

他のお薬を服用している場合は、必ず担当医師にお知らせください。

お薬の整理にピルケースを活用してみましょう。

QR コードをスキャンするか、
www.RYBREVANT.com
にアクセスすることで、詳細
をご覧ください



データ料金がかかる
場合があります。

RYBREVANT® を使用した治療があなたに適していると
判断された際は、以下にご登録ください。

RYBREVANT withMe

個人に合わせたマンツーマンサポート

無料のあなた専用マンツーマンサポートをご利用いただけます。Care Navigator は、治療期間を通じて支援サービスをご案内しています。

833-JNJ-WME1 (833-565-9631) までお電話ください（月曜～金曜、米国東部標準時
午前 8:00 ～午後 8:00）。Ofrecemos asistencia en Español.